

RECOMMANDATIONS APRÈS L'EXTRACTION D'UNE DENT

Votre enfant a subi l'extraction d'une ou plusieurs dents dans notre cabinet. Voici nos conseils en cas d'apparition de certains symptômes et nos recommandations post-opératoires :

1. Si possible, laissez votre enfant mordre sur une compresse pour éviter le saignement, pendant 10 minutes.

2 **Après une anesthésie**, il faut attendre minimum 1 heure pour que l'engourdissement cesse. Durant cette période **il faut éviter que votre enfant mâche pour ne pas risquer qu'il se morde la langue, la lèvre ou la joue**. En cas de morsure contactez le cabinet.

3. Donnez des antalgiques (les comprimés contre la douleur) à votre enfant selon la prescription médicale. Commencez à les donner avant que l'anesthésie soit terminée et donnez-les régulièrement, tel que prescrits, toutes les 4 à 6 heures pendant minimum 24 heures. N'attendez pas que votre enfant manifeste sa douleur.

4. Une ou plusieurs éponges hémostatiques ont été insérées dans l'alvéole d'extraction pour réduire le saignement post-opératoire et favoriser la cicatrisation. Il est possible qu'une éponge puisse tomber. Ne vous inquiétez pas.

5. En cas de douleur persistante, contactez le cabinet.

6. Il peut apparaître au site d'injection d'anesthésie une "boule" dure et bleue, signe d'une petite sous-muqueuse. Cette bosse disparaîtra en quelques heures. Un hématome sera peut-être visible dans la région durant les jours suivants. Il passera par le stade de "bleu" puis deviendra vert/jaune et disparaîtra en maximum 10 jours.

7. **Pendant 24 heures, évitez que votre enfant pratique une activité sportive.**